

## ANEXO

CALENDARIO DE VACUNACIONES E INMUNIZACIONES PARA TODA LA VIDA DE LAS PERSONAS DE CASTILLA Y LEÓN. 2026																											
	Prenatal	0 m	2m	3m	4m	5m	6m	11m	12m	15m	23m	2a	3a	4a	6a	11a	12a	14a	15-25 a*	26-59 a*	60-64 a*	65a*	80a*	>65a*			
Virus respiratorio sincitial (VRS)		AcVRS <sup>1</sup>																									
Rotavirus			RV	RV	(RV) <sup>2</sup>																						
Hepatitis B																											
Difteria-tétanos-tosferina	dTpa <sup>4</sup>		HB <sup>3</sup> DTPa																								
Poliomielitis			VPI Hib																								
Haemophilus influenzae tipo b																											
Neumococo			VNC20				VNC20	VNC20																		VNC21 <sup>5</sup>	
Meningococo ACWY																										Men ACWY	
Meningococo B			MenB																							Men ACWY	
Sarampión-rubeola-parotiditis																										SRP	
Varicela																										SRP VVZ	
Virus papiloma humano																										VVZ <sup>6</sup> VPH9 <sup>7</sup>	
Gripe	VIG <sup>8</sup>																									VIG <sup>9</sup>	
COVID-19	COVID <sup>10</sup>																									VVAG <sup>9</sup> VIG <sup>9</sup>	
Herpes zóster/su																										COVID <sup>10</sup> HZ/su <sup>11</sup> HZ/su <sup>11</sup>	

**AcVRS:** Anticuerpo monoclonal frente a virus respiratorio sincitial; **RV:** rotavirus; **HB:** hepatitis B; **dTpa:** difteria, tétanos y tosferina de baja carga antigénica; **DTPa:** difteria, tétanos y tosferina de alta carga antigénica; **Td:** tétanos y difteria; **VPI:** vacuna frente a polio inactivada; **Hib:** Vacuna conjugada frente al Haemophilus influenzae tipo b; **VNC20:** vacuna frente a neumococo conjugada con 20 serotipos; **VNC21:** vacuna frente a neumococo conjugada con 21 serotipos; **MenACWY:** vacuna frente a meningococo ACWY; **MenB:** vacuna frente a meningococo B; **SRP:** vacuna frente a sarampión, rubeola y parotiditis; **VVZ:** vacuna frente a virus varicela zóster; **VPH9:** vacuna frente a virus papiloma humano 9 genotipos **VIG:** vacuna inactivada frente a gripe; **VVAG:** vacuna viva atenuada frente a gripe (intranasal); **COVID-19:** vacuna frente a la COVID-19; **HZ/su:** vacuna de subunidades frente a herpes zóster.

- AcVRS:** Inmunización frente a virus respiratorio sincitial con AcVRS en personas nacidas desde el 1 de abril del año en curso al 31 de marzo del año siguiente, en su primera temporada de VRS.
- RV:** Pauta de dos o tres dosis en función de la vacuna administrada.
- HB:** En hijos de madres portadoras de Ag HBs se administrará vacuna frente a HB monovalente en las primeras 24 horas de vida junto con inmunoglobulina específica de la HB. En estos niños, la pauta resultante es de 4 dosis: 0, 2, 4 y 11 meses de edad.
- dTpa:** En cada embarazo a partir de la semana 27 de gestación, preferentemente en la semana 27 o 28.
- VNC21:** A los 65 años, en personas nacidas a partir del 1 de enero de 1961 y que no hayan recibido previamente la VNC. La población mayor de 65 años que no haya sido previamente vacunada con VNC13 o VNC20, se podrá vacunar con VNC21 de forma oportunista, priorizando la vacunación de las personas nacidas a partir del año 1951, cohorte con la que se inició la vacunación con VNC en Castilla y León.
- VVZ:** Solo en personas que refieren no haber pasado la enfermedad y no haber sido vacunadas con anterioridad. Pauta de dos dosis separadas por un intervalo mínimo de 8 semanas.
- VPH9:** A los 12 años pauta de una dosis. Captación activa de varones no vacunados previamente hasta los 25 años (inclusive) con pauta de una dosis (cohortes de varones nacidos entre 2001-2010). Las mujeres nacidas a partir de 1994 y los varones nacidos a partir de 2011, no vacunados previamente, podrán recibir la pauta recomendada para su edad.
- GRIPE prenatal:** En temporada de gripe se vacunará a embarazadas en cualquier trimestre de la gestación.
- GRIPE:** Administración anual en campaña. En población sana, se administrará una única dosis independientemente de la edad (consultar instrucción específica).
- COVID-19:** Según las recomendaciones de la Estrategia de vacunación frente a COVID 19 vigente en cada momento.
- HZ/su:** A los 65 años, en personas nacidas a partir de 1957, y a los 80 años, en personas nacidas a partir de 1944. Pauta de dos dosis separadas por un intervalo mínimo de 8 semanas.

\* A partir de los 15 años, se aprovechará el contacto de personas de cualquier edad con los servicios sanitarios, incluyendo los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales y los Centros de Vacunación Internacional, para revisar el estado de vacunación y aplicar pautas correctoras en caso necesario.